

0歳の予防接種スケジュール

ワクチンデビューは、生後2か月の誕生日

0歳の赤ちゃんをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、生後2か月になったらできるだけ早くワクチンを受けることが大切です。ワクチンの種類、接種回数が多いので、かかりつけの医師と相談のうえ同時接種で受けましょう。

ワクチン名	接種済み <input checked="" type="checkbox"/>	誕生											1歳				
		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月					
B型肝炎 任意	<input type="checkbox"/>		①	②													
ロタウイルス (2回接種・3回接種) 任意	<input type="checkbox"/>		1	2													
ヒブ 任意	<input type="checkbox"/>		①	②	③												④
小児用肺炎球菌 任意	<input type="checkbox"/>		①	②	③												④
三種混合 (DPT) 定期	<input type="checkbox"/>				①	②	③										④
ポリオ(単独) 定期	<input type="checkbox"/>																
BCG 定期	<input type="checkbox"/>								①								

必要回数を接種するためには、生後2か月になったらすぐに同時接種で受けましょう。

ロタウイルスワクチンは2種類あります。できるだけ生後14週6日までに接種を開始し、それぞれの必要接種回数を受けましょう。

接種費用の助成制度があります。お住まいの自治体に確認してください。

1歳代の追加接種を忘れずに受けましょう。

2012年11月以降、不活化ポリオワクチンを含む四種混合ワクチンに切り替わる予定です。

2012年9月から導入されます。

個別接種の場合はヒブ・小児用肺炎球菌・三種混合などと同時接種で受けられます。

不活化ワクチン 注射・スタンプ式

生ワクチン 経口

定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。

任意 多くは有料(自己負担)。ワクチンによっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。

定期予防接種の対象年齢

任意接種の接種できる年齢

おすすめの接種時期(数字は接種回数)

●次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。

同時接種 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。国や日本小児科学会は乳幼児の接種部位として大腿外側部も推奨しています。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

詳しい情報は <http://www.know-vpd.jp/>

VPD 検索

予防接種スケジュール

大切な子どもを VPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。このスケジュールは NPO法人 VPD を知って、子どもを守ろうの会によるもっとも早期に免疫をつけるための提案です。お子さまの予防接種に関しては、地域ごとの接種方法や VPD の流行状況に応じて、かかりつけ医と相談のうえスケジュールを立てましょう。

ワクチン名	接種済み ☑	0 歳											1 歳											2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳		
		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳1か月	1歳2か月	1歳3か月	1歳4か月	1歳5か月	1歳6か月	1歳7か月	1歳8か月	1歳9か月	1歳10か月	1歳11か月	(満年齢)							
不活化ワクチン B型肝炎	任意	□□□	① → ② →											③ →																	
生ワクチン ロタウイルス (2回接種・3回接種)	任意	□□	① → ② →											③ →																	
不活化ワクチン ヒブ	任意	□□□□	① → ② → ③ →											④ →																	
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌	任意	□□□□	① → ② → ③ →											④ →																	
不活化ワクチン 三種混合 (DPT)	定期	□□□□	① → ② → ③ →											④ →																	
不活化ワクチン ポリオ (単独)	定期	□□□□	2012年9月から導入されます。																												
生ワクチン BCG	定期	□	① →																												
生ワクチン MR (麻しん風しん混合)	定期	□□												① →																	
生ワクチン おたふくかぜ	任意	□□												① →																	
生ワクチン みずぼうそう (水痘)	任意	□□	追加接種は、初回接種から3か月以上の間隔をあけて受けましょう。											① →																	
不活化ワクチン 日本脳炎	定期	□□□																													
不活化ワクチン インフルエンザ	任意	毎秋																													

ロタウイルスは2種類あります。できるだけ生後14週6日までに接種を開始し、それぞれの必要接種回数を受けましょう。

ロタウイルス・ヒブ・小児用肺炎球菌・三種混合の必要回数を早期に完了するためには、同時接種で受けることが重要です

接種費用の助成制度があります。お住まいの自治体に確認してください。

2012年11月以降、不活化ポリオワクチンを含む四種混合ワクチンに切り替わる予定です。

二種混合 (DT) : 11歳で追加接種 (接種対象11-12歳)

個別接種の場合はヒブ・小児用肺炎球菌・三種混合などと同時接種で受けられます。

MR (麻しん風しん混合) : 小学校入学の前年 (幼稚園・保育園の年長に相当) 1年間に接種 (4月~6月がおすすめ)

追加接種は、初回接種から3か月以上の間隔をあけて受けましょう。

インフルエンザ : 毎年、10月から11月ごろに接種しましょう。

日本脳炎 : 9歳で追加接種 (接種対象9-12歳)

不活化ワクチン 定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。 定期予防接種の対象年齢 ◀→ おすすめの接種時期(数字は接種回数)

生ワクチン 任意 多くは有料(自己負担)。ワクチンによっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。 任意接種の接種できる年齢 ●次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。

同時接種 : 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。 国や日本小児科学会は乳幼児の接種部位として大腿外側部も推奨しています。くわしくはかかりつけ医にご相談ください。 詳しい情報は <http://www.know-vpd.jp/> **VPD** **検索**